

NOTIZIARIO

AGROMETEOROLOGICO & FITOSANITARIO

"REGIONALE"

Settimanale N. 2 Anno XXXVII

11 - 17 gennaio 2023

Servizi Agrometeo

Previsioni Meteo Locali,
Dati Osservati da Stazione,
Avvisi Fitopatologici,
Irrigazione e Concimazione


Sommario

1. METEOROLOGIA

2. DATI PREVISTI

3. CLIMATOLOGIA


4. FITOPATOLOGIA



**Agenzia Regionale per le Attività
Irrigue e Forestali della Puglia**

METEOROLOGIA

Puglia



Situazione Attuale

Sull'Italia la pressione atmosferica è in temporaneo aumento apportando per la giornata odierna tempo stabile e soleggiato, tuttavia una nuova perturbazione interesserà in serata le regioni settentrionali.

Evoluzione:

nel corso della giornata di domani giovedì 12, si prevede il passaggio di una nuova e veloce perturbazione che interesserà soprattutto le regioni centro-meridionali, riportando delle precipitazioni sparse. Nel fine settimana è attesa una nuova rimonta dell'alta pressione che determinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Da domenica 15 si prevede l'arrivo di una nuova perturbazione che apporterà un nuovo peggioramento del tempo ad iniziare dalle regioni settentrionali.



mercoledì 11 gennaio 2023

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo residui annuvolamenti sulla Puglia meridionale.

Temperatura senza variazioni di rilievo.

Venti moderati con residui rinforzi da nord-ovest.

Mari molto mossi o agitati ma con moto ondoso in attenuazione.




giovedì 12 gennaio 2023

Cielo irregolarmente nuvoloso con nuvolosità a tratti intensa associata a piogge sparse, più intense nella seconda parte della giornata.

Temperatura in diminuzione.

Venti da nord-ovest con intensità da debole a moderata.

Mari generalmente poco mossi o localmente mossi.



venerdì 13 gennaio 2023

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo residui annuvolamenti al primo mattino.

Temperatura in aumento nei valori massimi.

Venti deboli o temporaneamente moderati tendenti a disporsi dai quadranti sud-occidentali.

Mari poco mossi o quasi calmi.




sabato 14 gennaio 2023

Cielo sereno o parzialmente nuvoloso, salvo locali annuvolamenti associati a qualche breve piovasco.

Temperatura senza variazioni di rilievo.

Venti da deboli a moderati dai quadranti nord-occidentali.

Mari da poco mossi a quasi calmi.



domenica 15 gennaio 2023

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Altri Fenomeni: foschie dense al primo mattino.

Temperatura in diminuzione nei valori minimi, in lieve aumento nei valori massimi.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mari da quasi calmi a poco mossi, con moto ondoso in ulteriore aumento a fine giornata.

Tendenza per lunedì 16 e martedì 17 gennaio 2023

Prevalenza di tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento, ma con tendenza a peggioramento da martedì 17.

DATI PREVISTI

Dal 11-01-2023 al 15-01-2023

DATA	CIELO		VENTO		TEMP.		UMID.		FENOMENI	PREC	MARE
	ORE 00:00	ORE 12:00	ORE 00:00	ORE 12:00	min	max	min	max	Tipo	%	mm
FOGGIA											
11 gen	Poco nuvoloso	Sereno	Debole-Moderato NW	Moderato NW	5	12	45	75			
12 gen	Sereno	Coperto	Calmo SW	Moderato NW	2	11	60	70			
13 gen	Sereno	Poco nuvoloso	Debole W	Calmo SW	2	12	65	90			
14 gen	Sereno	Molto nuvoloso	Debole NW	Debole NW	3	12	65	95			
15 gen	Coperto	Nuvoloso	Calmo-Debole SE	Debole SW	2	14	60	95			
SANNICANDRO GARGANICO											
11 gen	Sereno	Sereno	Molto Forte N	Quasi Forte NW	10	13	50	70			Molto mosso
12 gen	Molto nuvoloso	Molto nuvoloso	Debole-Moderato S	Forte NW	7	12	65	90	Pioggia	50	5
13 gen	Poco nuvoloso	Nuvoloso	Quasi Forte N	Calmo SW	6	13	60	80			Quasi calmo
14 gen	Sereno	Molto nuvoloso	Debole SW	Moderato NW	7	13	65	95	Pioggia	50	2
15 gen	Molto nuvoloso	Nuvoloso	Debole-Moderato S	Quasi Forte SSW	6	13	70	85			Quasi calmo
ANDRIA											
11 gen	Nuvoloso	Sereno	Forte NW	Quasi Forte NW	4	12	45	90			
12 gen	Sereno	Coperto	Debole-Moderato SW	Moderato NW	3	11	60	85	Piovasco	50	2
13 gen	Poco nuvoloso	Sereno	Debole SW	Debole-Moderato SW	3	12	55	90			
14 gen	Sereno	Nuvoloso	Debole-Moderato SW	Calmo-Debole NW	3	12	70	90			
15 gen	Nuvoloso	Poco nuvoloso	Debole S	Moderato SW	3	14	60	100			
BARI											
11 gen	Molto nuvoloso	Poco nuvoloso	Molto Forte NW	Forte NW	10	13	50	70			Agitato
12 gen	Sereno	Coperto	Debole SW	Moderato WNW	6	12	65	90	Pioggia	80	5
13 gen	Sereno	Poco nuvoloso	Moderato N	Moderato SW	8	13	55	90			Poco mosso
14 gen	Sereno	Molto nuvoloso	Debole-Moderato W	Debole-Moderato NW	8	13	80	95	Pioggia	50	4
15 gen	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Debole SW	Debole-Moderato SW	5	14	55	95			Quasi calmo
GIOIA DEL COLLE											
11 gen	Molto nuvoloso	Nuvoloso	Molto Forte NW	Quasi Forte NW	5	9	60	75			
12 gen	Sereno	Molto nuvoloso	Debole NW	Moderato NW	2	9	70	90	Pioggia	80	8
13 gen	Poco nuvoloso	Nuvoloso	Debole NW	Debole-Moderato SW	3	12	60	90			
14 gen	Sereno	Molto nuvoloso	Debole SW	Moderato NW	4	11	80	85	Pioggia	50	4
15 gen	Nuvoloso	Poco nuvoloso	Debole W	Moderato SW	2	12	75	100			
BRINDISI											
11 gen	Coperto	Nuvoloso	Molto Forte NW	Forte NW	10	12	55	75			Agitato
12 gen	Nuvoloso	Coperto	Debole NW	Moderato NW	8	12	65	90	Rovescio	80	10
13 gen	Molto nuvoloso	Poco nuvoloso	Quasi Forte N	Moderato NW	8	13	65	80			Poco mosso
14 gen	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Debole SW	Quasi Forte NW	8	13	75	85			Poco mosso
15 gen	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Debole W	Moderato SW	8	13	65	95			Quasi calmo
GINOSA											
11 gen	Molto nuvoloso	Sereno	Moderato NW	Quasi Forte NW	8	13	50	70			Mosso
12 gen	Sereno	Coperto	Debole NW	Moderato NW	5	10	65	70			Quasi calmo
13 gen	Poco nuvoloso	Sereno	Moderato N	Moderato W	6	14	60	95			Poco mosso
14 gen	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Calmo N	Debole NW	6	13	65	90			Calmo
15 gen	Poco nuvoloso	Sereno	Calmo-Debole N	Debole SSW	5	14	75	95			Quasi calmo
MANDURIA											
11 gen	Molto nuvoloso	Nuvoloso	Moderato NW	Quasi Forte NW	8	12	55	75			
12 gen	Poco nuvoloso	Coperto	Debole NW	Moderato WNW	4	12	65	90	Pioggia	70	4
13 gen	Nuvoloso	Nuvoloso	Debole N	Debole SW	5	13	60	85			
14 gen	Poco nuvoloso	Nuvoloso	Debole NW	Debole NW	5	12	65	90			
15 gen	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Debole NW	Debole-Moderato SW	4	14	70	100			
LECCE											
11 gen	Molto nuvoloso	Molto nuvoloso	Moderato NW	Forte NW	9	12	60	75			
12 gen	Poco nuvoloso	Molto nuvoloso	Debole W	Moderato NW	6	12	70	90	Pioggia	70	4
13 gen	Nuvoloso	Poco nuvoloso	Debole N	Calmo-Debole WNW	6	13	60	95			
14 gen	Molto nuvoloso	Sereno	Debole S	Debole-Moderato NW	6	13	65	90			
15 gen	Poco nuvoloso	Sereno	Debole NW	Debole-Moderato SW	5	14	70	100			
OTRANTO											
11 gen	Coperto	Molto nuvoloso	Molto Forte NW	Forte NW	10	12	60	65			Agitato
12 gen	Poco nuvoloso	Molto nuvoloso	Debole-Moderato W	Moderato W	8	11	75	80			Poco mosso
13 gen	Molto nuvoloso	Nuvoloso	Quasi Forte N	Moderato WNW	8	13	65	90			Quasi calmo
14 gen	Nuvoloso	Sereno	Debole SW	Moderato N	9	13	75	85			Quasi calmo
15 gen	Sereno	Sereno	Debole NW	Debole-Moderato SW	8	15	65	95			Quasi calmo
SANTA MARIA DI LEUCA											
11 gen	Molto nuvoloso	Nuvoloso	Quasi Forte NW	Forte NW	9	12	60	70			Molto mosso
12 gen	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Debole-Moderato NW	Debole SW	8	11	70	80			Poco mosso
13 gen	Molto nuvoloso	Nuvoloso	Quasi Forte N	Moderato NW	8	13	60	90			Poco mosso
14 gen	Nuvoloso	Sereno	Debole W	Debole-Moderato N	9	13	65	85			Poco mosso
15 gen	Sereno	Sereno	Debole N	Debole-Moderato SSW	8	15	70	90			Poco mosso

CLIMATOLOGIA

SITUAZIONE PRECEDENTE Dal 02-01-2023 al 08-01-2023

All'inizio della settimana appena trascorsa lo scenario meteorologico sulla nostra Penisola si presentava ancora dominato da un campo di alta pressione di origine nord-africana che, pur determinando condizioni di tempo stabile favoriva la formazione di nubi basse e nebbie anche persistenti. Nei giorni di martedì 3 e mercoledì 4 deboli correnti umide ed instabili sono riuscite ad apportare lievi precipitazioni tra Sardegna e medio alto Tirreno. Un flusso di correnti moderatamente instabili ha lambito i settori alpini di confine settentrionale nella giornata di giovedì 5, ma l'alta pressione ha ripreso velocemente vigore anche su questa area. Solo nella giornata di domenica 8, un sistema frontale, associato a una profonda depressione atlantica, ha iniziato a scalfire più tenacemente il campo anticiclonico a cominciare dalle regioni del nord e la Toscana dirigendosi verso sud-est. Al seguito dell'area depressionaria si è andata instaurando una ventilazione particolarmente sostenuta.

Sulla nostra regione si è avuto pertanto una settimana all'insegna del tempo stabile, con cielo però solo in parte soleggiato. Anche sulle nostre aree infatti si sono formate nubi basse, foschie dense e nebbie in banchi, specialmente durante le ore più fredde della giornata, sulle zone pianeggianti e sulle valli interne.

Le temperature massime per l'intera settimana sono rimaste ben oltre i valori normali del periodo, facendo registrare scarti positivi anche di 8°C.

Le temperature minime invece, per l'intera settimana, sono oscillate con minimi scarti, intorno ai valori normali.

Il vento ha soffiato da sud sud-ovest nella giornata di lunedì 2, da ovest nord-ovest tra martedì 3 e venerdì 6, mentre tra sabato 7 e domenica 8 si sono gradualmente disposti dai quadranti meridionali. L'intensità è stata debole con rinforzi nella giornata di mercoledì 4 e localmente anche nella giornata di domenica 8.

DATI RILEVATI DAL 02-01-2023 AL 08-01-2023

COMUNE	PROV	LOCALITA	CODICE	TEMPERATURA (°C)			UMIDITA (%)			PREC. mm	EVAP. mm	Ore <7°C dal 1° Nov.
				MEDIA	MIN	MAX	MEDIA	MIN	MAX			
ALBEROBELLO	BA	ITAS	OPU31	9.3	3.8	18.7	90	50	100	1.4	5.2	170
ALTAMURA	BA	GUROLAMANNA	OPU01	8.3	4.4	16.4	96	67	100	1	3.5	329
ALTAMURA	BA	S.P. SANTERAMO	MBA22	6.4	-1.4	17.4	91	49	100	1.2	n.d.	499
BARI	BA	C.N.R. IRSA	OPU48	10.8	4.6	19.6	88	42	98	0.6	5	80
BINETTO	BA	PARCO DEI BUOI	OPU29	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
CASAMASSIMA	BA	SERRONE(AZ.AGR.MANCINI)	MBA27	10	4	19.3	31	19	51	0	n.d.	127
CASSANO DELLE MURGE	BA	S.P. SANNICANDRO	MBA24	9.6	3.1	19.9	87	44	100	1.4	n.d.	182
CONVERSANO	BA	CONTRADA COZZE	OPU52	10.4	4.6	17.5	91	61	100	0	4.3	74
CORATO	BA	CASTEL DEL MONTE	OPU50	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
GRAVINA IN PUGLIA	BA	S.P. SPINAZZOLA	MBA23	9.7	4.3	18.5	93	58	100	1	n.d.	182
GRAVINA IN PUGLIA	BA	LIMELLI D'IMPERATORE	OPU03	8.9	2.5	17.2	88	53	100	1.4	4.6	250
LOCOROTONDO	BA	ITAS VIA PER CISTERNINO	OPU49	8.7	0.1	18.3	n.d.	n.d.	n.d.	1.4	n.d.	268
MONOPOLI	BA	CONTRADA MATER DOMINI	OPU18	11.1	5	17.2	97	64	100	1	3.9	50
NOCI	BA	MURGIA ANTICI	MBA28	7.6	-0.6	15.9	95	56	100	1	n.d.	384
NOICATTARO	BA	VIA CASAMASSIMA	OPU30	10.4	5.7	18.7	77	55	90	1	3.6	95
PUTIGNANO	BA	LAMENDOLA I	MBA29	8.9	2.7	18.7	n.d.	n.d.	n.d.	1.4	n.d.	311
SANTERAMO IN COLLE	BA	VIA PER GIOIA DEL COLLE	MBA25	8.6	2.1	17.1	89	50	100	1.4	n.d.	316
TERLIZZI	BA	ITAS	OPU19	9.2	3.7	17.8	94	57	100	1.2	3.4	270
TORITTO	BA	QUASANO	OPU53	9.2	5.4	17.7	84	48	98	0.4	4.6	187
VALENZANO	BA	CAMPO SPER. UNIBA	MBA26	10.2	5.3	19.4	86	48	95	1	n.d.	113
BRINDISI	BR	TORRE MOZZA	OPU32	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
CAROVIGNO	BR	VIA PER CEGLIE MESSAPICA	OPU21	11	4.5	18.7	96	65	100	1.2	4	100
CEGLIE MESSAPICA	BR	FERRUZZO	MBR31	10.5	6.1	17.2	n.d.	n.d.	n.d.	1.6	n.d.	37
FASANO	BR	OTTAVA SEDICI	OPU04	10.9	5.2	18.9	92	55	100	0.8	5.3	59
FASANO	BR	FASCIANELLO	MBR30	11.6	6.5	17.3	88	51	100	0.4	n.d.	4
LATIANO	BR	MILETO	OPU34	9.5	1.3	17.1	89	55	100	1	5.3	311
MESAGNE	BR	MOCCARI	OPU33	10.4	3.5	16.8	94	63	100	1.2	4.1	166
OSTUNI	BR	MASSERIA SANTORO	OPU17	7.6	-1.9	17.9	95	60	100	0	3.9	423
SAN PIETRO VERNOTICO	BR	MAINE	OPU06	10.7	4.5	17.6	n.d.	n.d.	n.d.	1.2	n.d.	117
SAN VITO DEI NORMANNI	BR	SIGNORANNA	OPU35	10.6	3.2	19.6	86	59	95	1.4	6.3	161
TORRE SANTA SUSANNA	BR	ARCIPRETE	OPU54	9.3	0.1	18.4	86	48	98	1.2	5.6	317
VILLA CASTELLI	BR	VIA PER FRANCAVILLA FONT	OPU20	10.6	2.2	19.7	97	71	100	1.6	3.7	197
ANDRIA	BT	PAPPARICOTTA	OPU16	7.8	0.5	19.8	85	42	98	1.2	4	n.d.
ANDRIA	BT	MONTEGROSSO	MBA21	9.8	4.9	17.8	85	37	100	0.4	n.d.	92
CANOSA DI PUGLIA	BT	IPSAA	MBA20	8.1	0.4	18.5	90	49	100	1.2	n.d.	361
MINERVINO MURGE	BT	BOSCO ACQUATETTA	OPU51	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT	LA PERA DI BASSO	MFG17	8.6	1.7	18.4	89	44	99	1.4	n.d.	349
TRANI	BT	S.S. CORATO-TRANI	OPU28	9.4	2.4	16.2	84	52	93	0	n.d.	n.d.

DATI RILEVATI DAL 02-01-2023 AL 08-01-2023												
COMUNE	PROV	LOCALITA	CODICE	TEMPERATURA (°C)			UMIDITA (%)			PREC.	EVAP	Ore <7°C
				MEDIA	MIN	MAX	MEDIA	MIN	MAX	mm	mm	dal 1° Nov.
ALBERONA	FG	SERRONE	MFG12	9.7	3.9	16.2	89	60	100	0	n.d.	130
APRICENA	FG	CANALE	OPU22	9.3	3	17.3	94	54	100	1.2	3.6	237
ASCOLI SATRIANO	FG	BISCIGLIETO	MFG13	10.9	4.9	19.8	80	43	100	0.2	n.d.	44
ASCOLI SATRIANO	FG	PALAZZO PICCOLO	OPU39	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
CARLANTINO	FG	CAMPO SANTO VECCHIO	OPU56	7.7	2.8	16.1	93	53	100	1.8	5	418
CARPINO	FG	ARIOLA	MFG09	10.2	4.9	17.9	85	43	96	0.2	n.d.	69
CERIGNOLA	FG	TRESSANTI	MFG04	8.4	2.3	17.5	84	51	91	1	n.d.	305
CERIGNOLA	FG	TAVOLETTA	MFG06	8.5	0.3	19.1	91	51	100	1	n.d.	317
FOGGIA	FG	MONTEROZZI	MFG19	8.9	1.7	17.9	91	54	100	0.4	n.d.	n.d.
FOGGIA	FG	LA PESCIA	MFG03	9.1	3	18	82	49	92	1	n.d.	267
FOGGIA	FG	COPPA D'ORO	MFG07	8.4	1.4	17.5	85	55	95	0.6	n.d.	340
FOGGIA	FG	BORGO LA ROCCA	OPU38	8.9	2.5	17.9	92	54	100	0.6	3.9	272
LESINA	FG	RIPALTA	OPU55	10.1	4.1	17.5	93	50	100	0.6	4.6	65
LUCERA	FG	S. LUCIA	MFG01	8.1	2.4	18.1	94	63	100	0.2	n.d.	333
MANFREDONIA	FG	DAUNIA RISI	OPU23	7.8	0.7	17.6	95	54	100	0.6	3	361
ORTA NOVA	FG	TRIONFO	OPU07	9.4	2.7	19.8	91	55	100	0	2.5	265
PIETRAMONTECORVINO	FG	TORRETTA	OPU08	8.7	2.5	15.6	81	57	91	0	5.2	234
RIGNANO GARGANICO	FG	VILLANOVA	OPU36	8.5	-0.1	18	92	53	100	0.8	3.3	289
RODI GARGANICO	FG	S. LUCIA	MFG14	10.5	6.1	18.3	92	50	100	0.8	n.d.	49
SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	QUERCIA COPPE	MFG16	8.5	3.3	15.7	87	56	100	0.4	n.d.	339
SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	MATINE - CARNE SALATA	MFG10	9.9	4.4	19.4	86	49	100	0.2	n.d.	169
SAN SEVERO	FG	CASA LORDA	MFG15	9.2	2.3	17.6	93	60	100	1	n.d.	247
SANNICANDRO GARGANICO	FG	DON NUNZIO E CAVALLO	MFG08	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	PALOMBARA	OPU57	9.6	1.8	18.9	80	41	100	0.2	8.2	186
SERRACAPRIOLA	FG	CIAVATTA	OPU09	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
TORREMAGGIORE	FG	SELVA DELLE GROTTI	MFG11	8.5	1.3	18.8	96	59	100	0.6	n.d.	281
TROIA	FG	COLAZZE - GIARDINETTO	OPU37	8.1	0.7	19.1	75	29	100	1	7	322
TROIA	FG	SERRA DEI BISI	MFG02	9.9	4.6	16.6	76	44	97	0.2	n.d.	122
VIESTE	FG	MANDRIONE	MFG18	10.1	4.1	15.9	n.d.	n.d.	n.d.	0	n.d.	108
ZAPPONETA	FG	RIVOLI	MFG05	8.5	1.2	17.8	96	61	99	1	n.d.	286
CUTROFIANO	LE	VERGINE	OPU24	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
LECCE	LE	ITAS	OPU41	9.4	0.7	16.9	90	63	95	1.4	4	269
LECCE	LE	AEROCLUB	OPU62	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
LEVERANO	LE	ARCHE	OPU40	10.3	2.3	17.2	94	65	100	1.6	4.6	157
MARTANO	LE	MALOPRA	MLE35	10	2.2	17.6	77	56	91	1.4	n.d.	186
MINERVINO DI LECCE	LE	SCARCIGLIA (CNR)	OPU60	10.7	3.5	18.6	96	59	100	2	3.9	92
NARDO'	LE	BRUSCA	OPU61	10.4	3.5	17.1	89	58	97	0	5.9	146
NOCIGLIA	LE	VIA PER SUPERSANO	OPU25	10.2	1.7	18.8	94	62	100	0	4.6	160
OTRANTO	LE	FRASSANITO	OPU10	11.4	5.7	17.7	96	67	100	1.8	4	38
RACALE	LE	CONTE	OPU12	9.5	2.5	17.4	86	50	100	0.8	5.5	223
SALICE SALENTINO	LE	PANCRAZIO	OPU42	10.2	4	18.4	96	60	100	1.8	4.3	171
SQUINZANO	LE	BADESSA	OPU11	11.1	5	16.9	99	72	100	0.4	3.2	82
TRICASE	LE	LUCUGNANO	OPU43	10.2	2.3	17.5	94	66	100	1.6	4.7	157
UGENTO	LE	BARBARO	MLE34	9.7	1.7	17	92	60	100	1.8	n.d.	302
CASTELLANETA	TA	TAFURI	OPU14	7.5	0.5	15.6	91	51	100	1.6	n.d.	375
CASTELLANETA	TA	CASTELLANETA MARINA	OPU47	9.7	3.4	18.9	88	43	100	1.6	3.8	195
GINOSA	TA	VERSO PALAGIANO	OPU58	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	65
GROTTAGLIE	TA	VERSO TARANTO-PAOLO VI	OPU27	9.1	1.5	17.7	90	47	100	1.4	n.d.	251
MANDURIA	TA	TORRE ROSSA	OPU44	10.5	2.9	18.5	91	52	100	1.2	5.5	121
MARTINA FRANCA	TA	VERSO MASSAFRA	MTA32	10.3	4.5	18.5	84	45	97	1.4	n.d.	117
MASSAFRA	TA	AMENDOLECCHIA	OPU46	10.4	3.4	19.1	83	45	100	62.9	5.3	128
MOTTOLA	TA	SAN BASILIO	OPU45	7.9	0.6	15.7	92	51	100	0.2	4.9	327
PALAGIANELLO	TA	MONTE D'ORO	OPU59	10.9	5.7	19.4	84	47	97	0.4	4.6	66
SAN GIORGIO IONICO	TA	VERSO TARANTO	MTA33	9.3	0.3	17.7	93	54	100	0.8	n.d.	240
TARANTO	TA	LE MARINE	OPU15	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
TORRICELLA	TA	VERSO MARINA DI LIZZANO	OPU13	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
MEDIA				9.5	2.9	17.9	88.6	53.2	98.1	1.7	4.5	206.3
MINIMO				6.4	-1.9	15.6	31	19	51	0.0	2.5	4
MASSIMO				11.6	6.5	19.9	99	72	100	62.9	8.2	499

FITOPATOLOGIA

BARI E BAT

OLIVO



Situazione Fenologica:

Riposo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza infezioni fungine.

Programma di Difesa:

Subito dopo la raccolta è consigliabile un intervento con formulati rameici allo scopo di disinfettare le microferite, determinate da attrezzi per la raccolta, in cui possono insediarsi infezioni di rogna (*Pseudomonas savastanoi*). Il trattamento risulta utile anche per il contenimento di infezioni di occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*) e di altri agenti di origine fungina.

Si consiglia al fine di contenere diverse avversità parassitarie, di effettuare la potatura tanto da arieggiare la chioma delle piante.

Per quanto concerne la *Xylella fastidiosa* si rimanda a quanto previsto dalla [deliberazione della giunta regionale del 12 dicembre 2022, n. 1866 Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa \(Well et al.\) in Puglia" biennio 2023-2024](#) ed ai comunicati ufficiali dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, pubblicati sul sito internet: www.emergenzaxylella.it.

VITE DA VINO



Situazione Fenologica:

Caduta foglie.

Situazione Fitosanitaria:

Forme svernanti di attività parassitarie.

Programma di Difesa:

Individuare le piante affette da mal dell'esca e segnalarle con nastri, al fine di identificarle in fase di potatura.

VITE DA TAVOLA



Situazione Fenologica:

Caduta foglie - riposo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza di infezioni fungine.

Programma di Difesa:

Prima della fase di caduta delle foglie individuare le piante affette da mal dell'esca e segnalarle con nastri, al fine di identificarle e potarle separatamente, disinfettando di volta in volta gli attrezzi da taglio.

CILIEGIO



Situazione Fenologica:

Caduta foglie - riposo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Si riscontrano piante infette da corineo (tronco e rami).

Programma di Difesa:

Nessun trattamento, aspettare la caduta completa delle foglie.

ALBICOCCO



Situazione Fenologica:

Caduta foglie - riposo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Forme svernanti di infezioni fungine.

Programma di Difesa:

Nessun trattamento, aspettare la caduta completa delle foglie.

PATATA



Situazione Fenologica:

Semina - trapianto.

Situazione Fitosanitaria:

Nessuna.

Programma di Difesa:

Inizia la campagna pataticola, bisogna tenere conto che ampie rotazioni colturali, previste e prescritte dalle norme fitosanitarie, sono assolutamente necessarie per evitare il forte sviluppo di nematodi a cisti della patata che creano un anormale funzionamento dell'apparato radicale sconvolto internamente da gravi alterazioni delle cellule (D.lgs. 8 ottobre 2010, n.186 "Attuazione della direttiva 2007/33/CE relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata"). Vedasi linee guida per la difesa integrata dagli elateridi della patata.

INSALATA



Situazione Fenologica:

Accrescimento vegetativo - maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Porre attenzione alla presenza di infezioni fungine.

Programma di Difesa:

Nessun trattamento.

MANDORLO



Situazione Fenologica:

Caduta foglie - riposo vegetativo

Situazione Fitosanitaria:

Presenza localizzata di attacchi da fusicocco.

Programma di Difesa:

Nessun trattamento consigliato, attendere la caduta completa delle foglie.

FITOPATOLOGIA

FOGGIA

AGRUMI



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Programma di Difesa:

Nell'oasi agrumaria del Gargano è stata riscontrata una notevole presenza di *Aleurocanthus spiniferus*.

OLIVO



Situazione Fenologica:

Riposo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Nessun problema di rilievo.

Programma di Difesa:

Nessun trattamento.

Per quanto concerne la *Xylella fastidiosa* si rimanda a quanto previsto dalla [deliberazione della giunta regionale del 12 dicembre 2022, n. 1866 Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa \(Well et al.\) in Puglia" biennio 2023-2024](#) ed ai comunicati ufficiali dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, pubblicati sul sito internet: www.emergenzaxylella.it.

PESCO



Situazione Fenologica:

Riposo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Esiti di avversità parassitarie.

Programma di Difesa:

In occasione delle potature è importante asportare e distruggere i rami colpiti da corineo, moniliosi e altri patogeni che determinano disseccamenti rameali.

VITE DA VINO



Situazione Fenologica:

Riposo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Ceppi attaccati dal mal dell'esca.

Programma di Difesa:

Le piante segnate per la presenza di mal dell'esca, vanno potate separatamente dalle altre per limitare l'ulteriore diffusione della malattia per mezzo degli attrezzi da taglio che vanno sempre disinfettati. In caso di piante totalmente colpite si deve procedere all'estirpazione e alla rimozione delle stesse fuori dal vigneto.

VITE DA TAVOLA



Situazione Fenologica:

Riposo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Ceppi attaccati dal mal dell'esca.

Programma di Difesa:

Le piante segnate, attaccate da mal dell'esca, vanno potate separatamente dalle altre per limitare l'ulteriore diffusione della malattia per mezzo degli attrezzi da taglio che vanno sempre disinfettati. In caso di piante totalmente colpite si deve procedere all'estirpazione e alla rimozione delle stesse fuori dal vigneto.

CARCIOFO



Situazione Fenologica:

Formazione capolini - raccolta.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza di arvicole.

Programma di Difesa:

Per le arvicole non essendoci prodotti utilizzabili in pieno campo si consiglia di intensificare le lavorazioni superficiali del terreno.

CAVOLO



Situazione Fenologica:

Sviluppo vegetativo - raccolta.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza di infezioni batteriche e fungine, presenza di tignola delle crucifere e nottue.

Programma di Difesa:

In relazione all'andamento climatico (piogge, temperature non molto alte) si consiglia di effettuare un trattamento con composti rameici per prevenire eventuali attacchi crittogamici. Per la tignola delle crucifere e le nottue, trattare alla comparsa dei primi danni con uno dei seguenti principi attivi: *Bacillus thuringiensis*, deltametrina, spinosad, spinetoram, emamectina, clorantraniliprole.

FRUMENTO



Situazione Fenologica:

Emergenza.

Situazione Fitosanitaria:

Nessun problema di rilievo.

Programma di Difesa:

Nessun trattamento.

ASPARAGO



Situazione Fenologica:

Sviluppo della fronda.

Situazione Fitosanitaria:

Lievi attacchi di puccinia ed in alcuni appezzamenti attacchi di *Hypochoa caestrum*.

Programma di Difesa:

Si consiglia di monitorare con attenzione gli attacchi di *Hypochoa caestrum*, cosside dell'asparago, la cui larva divora i germogli e tronca le radici, soprattutto nelle giovani piantagioni.

FITOPATOLOGIA

BRINDISI

OLIVO



Situazione Fenologica:

Raccolta - stasi vegetativa. Nonostante il periodo, le temperature rimangono ancora abbondantemente al di sopra della norma stagionale. Questo determina, in alcune situazioni, una continua attività vegetativa evidenziabile con la formazione di nuova vegetazione agli apici delle vermine. Il fenomeno è particolarmente evidenziabile su impianti in scarica, di cv precoci e dove è stata effettuata una eccessiva concimazione azotata.

Situazione Fitosanitaria:

Le catture di mosca (*Bactrocera oleae*) si sono numericamente ridotte in tutta la provincia dove, comunque restano uniformemente presenti. A seconda delle zone e della gestione fitosanitaria delle singole realtà olivicole, è sempre osservabile un generale deperimento delle ultime drupe a causa sia di pregressi attacchi di mosca sia di infezioni di lebbra e/o di altri funghi simbiotici. Ovviamente fenomeni più marcati si evidenziano negli impianti in cui le specifiche strategie di controllo sono state poco efficaci per il loro contenimento e negli areali in cui le infestazioni di mosca sono state particolarmente intense. Infine si nota una accentuata filloptosi (caduta delle foglie) causata da cercosporiosi (*Mycocentrospora cladosporioides*) soprattutto nelle zone vallive e collinari dove maggiore è il ristagno permanente di umidità.

Programma di Difesa:

Nessun trattamento sugli impianti dove ancora non si sono ultimate le operazioni di raccolta. Solo dopo la raccolta è opportuno effettuare un intervento con formulati rameici allo scopo di disinfettare le micro ferite determinate da attrezzi per la raccolta in cui possono insediarsi infezioni di rogna (*Pseudomonas savastanoi*). Il trattamento risulta utile anche per il contenimento di infezioni di occhio di pavone (*Spilotea oleaginea*) e di altri agenti di origine fungina. Il trattamento con formulati rameici (preferire prodotti da solfato a quelli da ossicloruro ecc.) ha anche lo scopo di frenare la fase vegetativa la cui evoluzione potrebbe esporre le piante a danni da freddo dei prossimi mesi. In questo periodo sono altresì da evitare drastiche potature onde evitare che tale pratica stimoli ulteriormente la fase vegetativa delle piante.

Per quanto concerne la *Xylella fastidiosa* si rimanda a quanto previsto dalla [deliberazione della giunta regionale del 12 dicembre 2022, n. 1866 Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa \(Well et al.\) in Puglia" biennio 2023-2024](#) ed ai comunicati ufficiali dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, pubblicati sul sito internet: www.emergenzaxylella.it.

PESCO



Situazione Fenologica:

Stasi vegetativa.

Situazione Fitosanitaria:

Esiti di attacchi parassitari pregressi.

Programma di Difesa:

Allo scopo di ridurre l'inoculo delle diverse crittogame svernanti intervenire con prodotti a base di rame avendo cura di bagnare in ogni parte tutta la chioma.

Nelle operazioni di potatura eliminare il più possibile il legno compromesso da patogeni e distruggerlo con il fuoco, secondo i criteri e le normative vigenti. Evitare di trinciare in campo materiale contaminato da patogeni di difficile controllo, come cancri batterici, ecc. onde evitare che si creino serbatoi di diffusione nella prossima annata.

Una ottimale gestione del frutteto nella fase del "bruno" consente di ridurre la carica di molte forme svernanti di funghi patogeni, facilitando la difesa in fase vegetativa.

VITE DA VINO



Situazione Fenologica:

Stasi vegetativa.

Situazione Fitosanitaria:

Esiti di attacchi parassitari pregressi.

Programma di Difesa:

Nessun trattamento.

Iniziare le operazioni di potatura dopo essersi accertati della buona lignificazione dei tralci, avendo cura di potare separatamente dal resto del vigneto le piante affette da mal dell'esca, già segnate con nastri o vernice colorate in fase vegetativa, ricordandosi sempre di disinfettare con ipoclorito di sodio (candeggina) le attrezzature da taglio prima di passare da una pianta all'altra. Nei vigneti in cui è nota una significativa presenza della malattia, in "fase di pianto", è previsto uno specifico trattamento.

CARCIOFO



Situazione Fenologica:

Capolino involupato, capolino visibile, raccolta.

Situazione Fitosanitaria:

Infestazioni di arvicole, colonie di afide nero e verde, prime catture di nottue (*Gortyna xanthenes*) e depressaria (*Depressaria erinaceella*), oidio (*Leveillula taurica*), peronospora (*Bremia lactucae*) e muffa grigia. Presenza di lumache e limacce.

Programma di Difesa:

Le catture di *Gortyna xanthenes*, sono piuttosto irregolari nei vari areali di monitoraggio. Monitorare la presenza dell'insetto attraverso le trappole a feromoni ed intervenire verso la fine del volo con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis*, alfa-cipermetrina, deltametrina, spinosad, lambdacialotrina ecc. Ogni trattamento trova giustificazione solo se si è vicini alla soglia di intervento e se si può garantire, per eccesso e mai per difetto, il periodo di sicurezza dei formulati adoperati.

Il prolungato periodo di umidità accompagnato da temperature miti è favorevole a infezioni oidiche e peronosporiche contro le quali si consiglia di intervenire con prodotti specifici solo se si è in grado di rispettare il periodo di carenza dei vari formulati.

A causa delle elevate umidità si riscontrano infezioni da muffa grigia (*Botrytis cinerea*) a carico dei capolini contro cui si può intervenire con formulati a base di boscalid, piraclostrobin ecc. avendo cura, anche in questo caso, di osservare il relativo periodo di carenza prima della raccolta.

Controllare lo sviluppo di lumache e limacce con l'uso di specifiche esche a base di fosfato ferrico possibilmente distribuite in maniera localizzata nei punti di maggior presenza dei gasteropodi.

Per le arvicole (topi) non essendoci, ancora, prodotti utilizzabili in pieno campo si consiglia di intensificare le lavorazioni superficiali del terreno allo scopo di contenere o quantomeno di allontanare dal campo, le colonie dei roditori.

FITOPATOLOGIA

LECCE

AGRUMI



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza di catture di mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*) - presenza di fetola (*Empoasca decedens*) e allupatura (*Phytophthora spp.*).

Programma di Difesa:

Condizioni climatiche caratterizzate da piovosità e da un elevato tasso di umidità relativa, favoriscono le infezioni di allupatura dei frutti; si consiglia, pertanto, di mantenere il terreno inerbito al fine di trattenere gli schizzi di pioggia, per ridurre il rischio di infezione.

Si raccomanda di effettuare eventuali trattamenti, tenendo conto della presunta data di raccolta e di rispettare scrupolosamente le dosi e i tempi di carenza indicati in etichetta.

OLIVO



Situazione Fenologica:

Maturazione. Le temperature superiori alle medie del periodo hanno determinato, per alcune cultivar e per impianti in scarica, un'attività vegetativa con la formazione di nuova vegetazione.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza di mosca (*Bactrocera oleae*), insetti lignicoli, occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra.

Programma di Difesa:

Negli oliveti dove è stata completata la raccolta, si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti a base di rame per il controllo delle crittogame e per disinfettare le ferite causate dalle operazioni di raccolta.

Si ricorda di rimuovere dai tronchi delle giovani piante, le fasce di resinato applicate per la cattura dell'oziorrinco, in quanto l'umidità e le basse temperature invernali, potrebbero determinare danni alla corteccia sottostante.

Per quanto concerne la *Xylella fastidiosa* si rimanda a quanto previsto dalla [deliberazione della giunta regionale del 12 dicembre 2022, n. 1866 Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa \(Well et al.\) in Puglia" biennio 2023-2024](#) ed ai comunicati ufficiali dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, pubblicati sul sito internet: www.emergenzaxylella.it.

VITE DA VINO



Situazione Fenologica:

Riposo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Esiti di attacchi parassitari pregressi.

Programma di Difesa:

Durante le operazioni di potatura sulle piante affette da mal dell'esca, già segnalate durante il periodo vegetativo, si consiglia di intervenire separatamente asportando le parti invase dal fungo ed eliminando le piante non più risanabili. Gli attrezzi impiegati per la potatura, per limitare la diffusione della malattia, dovranno essere disinfettati, prima di essere utilizzati sulle piante sane, con ipoclorito di sodio o sali quaternari di ammonio.

Nei vigneti affetti da escoriosi si consiglia di allontanare dal campo e distruggere il materiale di risulta della potatura.

MELOGRANO



Situazione Fenologica:

Riposo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Programma di Difesa:

FITOPATOLOGIA

TARANTO

AGRUMI



Situazione Fenologica:

Maturazione - raccolta.

Situazione Fitosanitaria:

Allupatura (*Phytophthora spp.*) - macchie d'acqua (water spot).

Programma di Difesa:

Nessun intervento fitosanitario. Attendere la ripresa naturale delle piante e poi decidere gli interventi da fare.

OLIVO



Situazione Fenologica:

Riposo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza di malattie fungine e rogna.

Programma di Difesa:

Nessun intervento fitosanitario. Attendere la ripresa naturale delle piante.

Durante la potatura eliminare le parti più attaccate dai parassiti avendo cura di garantire l'arieggiamento e l'illuminazione della chioma.

Contro le carie, dopo l'eliminazione del marciume presente, si consiglia di cicatrizzare il legno scoperto con una fiamma.

Dopo la potatura può anche essere utile un trattamento con composti rameici per contenere danni da malattie fungine e da rogna. Questo si consiglia laddove la raccolta è stata eseguita con agevolatori meccanici (pettini, ecc.) e dove le ferite sono state provocate da agenti meteorologici.

Per quanto concerne la *Xylella fastidiosa* si rimanda a quanto previsto dalla [deliberazione della giunta regionale del 12 dicembre 2022, n. 1866 Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa \(Well et al.\) in Puglia" biennio 2023-2024](#) ed ai comunicati ufficiali dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, pubblicati sul sito internet: www.emergenzaxylella.it.

VITE DA VINO



Situazione Fenologica:

Riposo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Esiti di avversità parassitarie.

Programma di Difesa:

Nessun trattamento.

Evidenziare con del nastro colorato o con della calce i ceppi colpiti dal mal dell'esca i quali andranno potati o divelti in un secondo momento. Disinfettare gli attrezzi da taglio ogni qual volta ci sia il sospetto di essere di fronte ad una pianta con sintomi associabili a patogeni di difficile controllo.

VITE DA TAVOLA



Situazione Fenologica:

Riposo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Esiti di avversità parassitarie.

Programma di Difesa:

Nessun trattamento.

Evidenziare con del nastro colorato o con della calce i ceppi colpiti dal mal dell'esca i quali andranno potati o divelti in un secondo momento. Disinfettare gli attrezzi da taglio ogni qual volta ci sia il sospetto di essere di fronte ad una pianta con sintomi associabili a patogeni di difficile controllo.

MELOGRANO



Situazione Fenologica:

Riposo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Niente da segnalare.

Programma di Difesa:

Nessun trattamento.

CONSIGLI A CARATTERE GENERALE DIFESA FITOSANITARIA

PER TUTTE LE COLTURE CHE SONO PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI POSSONO EFFETTUARE INTERVENTI SEMPRE CHE SIA POSSIBILE RISPETTARE RIGOROSAMENTE I TEMPI DI CARENZA DELLE SOSTANZE ATTIVE DA UTILIZZARE.

Per effettuare una buona difesa fitosanitaria occorre:

- una conoscenza approfondita dei parassiti da contenere, per colpirli nel momento più propizio e quando si interferisce il meno possibile sull'antagonismo naturale;
- attrezzature tarate e nella massima efficienza;
- preparazione della coltura in modo da poter facilmente colpire il parassita;
- nei casi dubbi, chiedere l'ausilio di tecnici specialisti esperti, per evitare di eseguire interventi di dubbio esito;
- si aggiunge che un nuovo impianto ha successo se le piante di propagazione sono sane e il terreno per l'impianto è privo di problemi idraulico-agrari e fitosanitari. Infine, si ricorda che l'acqua utilizzata per i trattamenti deve avere un pH inferiore a 7, soprattutto quando ne è indicata la necessità.

INFORMAZIONI SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO

Nel marzo 1985 è stato avviato il primo **Piano Agrometeorologico Regionale** nell'ambito della realizzazione dei Servizi di Sviluppo dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

Il Piano, così come avvenuto nelle successive fasi, ha avuto come principale obiettivo la costituzione e la gestione di un Servizio Agrometeorologico a livello regionale per acquisire, elaborare e diffondere informazioni meteo-climatiche, tecnico-agronomiche finalizzate al mondo agricolo.

Le principali realizzazioni del Servizio Agrometeorologico riguardano:

- la Rete Agrometeorologica Regionale composta da 94 stazioni di rilevamento dati meteorologici e agrometeorologici, completamente automatiche e in tempo reale;
- la Rete dei Campi di osservazioni Agrofenologiche e Fitopatologiche;
- la Banca Dati Agrometeorologica Regionale costituita da una componente climatica, che comprende i dati storici climatici del Sistema Informativo Agricolo Nazionale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (SIAN), i dati storici dell'ex UCEA, oggi C.R.E.A. (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), dell'ex Servizio Idrografico e Mareografico oggi Regione Puglia, Settore Protezione Civile Ufficio Idrografico e Mareografico e dell'Aeronautica Militare a partire dal 1951 fino all'anno corrente, da una componente meteorologica, specializzata per l'agricoltura, riguardante le informazioni e le elaborazioni effettuate sui dati meteorologici acquisiti in tempo reale, e da una componente agrofenologiche e fitopatologica;
- i Prodotti Agro-Climatologici (analisi oggettiva, analisi dei regimi climatici, analisi di eventi estremi, indici agro-climatici, sviluppo fenologico, bilancio idrico, piani di concimazione, modelli previsionali sviluppo patogeni, pianificazione del territorio, ecc.);
- il Notiziario Agrometeorologico e Fitosanitario settimanale con previsioni fino a 7 giorni;
- il Bollettino Meteorologico giornaliero Regionale con previsioni fino a 7 giorni;

NOTIZIARIO AGROMETEOROLOGICO & FITOSANITARIO REGIONALE

ELABORAZIONE E REDAZIONE

Sezione Meteorologia e Climatologia

Gennaro Laera mail: g.laera@arif.regione.puglia.it

Angelo Petrelli mail: a.petrelli@arif.regione.puglia.it

Sezione Fitopatologia

Provincia di BARI - BAT

Provincia di FOGGIA

Provincia di BRINDISI

Provincia di LECCE

Provincia di TARANTO

mail: fitosanitario@arif.regione.puglia.it

Su informazioni: Servizio Meteorologico Aeronautica Militare, Servizio Informativo Agricolo Nazionale, Rete Agrometeorologica Regionale.

In collaborazione con: Assessorato Agricoltura - Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste; Sezione Osservatorio Fitosanitario.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle previsioni del tempo consultare il sito www.arifpuglia.it (Sezione Servizio Agrometeorologico e Fitosanitario).

Registrandosi al suddetto sito è possibile usufruire di diversi servizi utili per la pianificazione delle attività delle aziende agricole e consultare i dati di monitoraggio sia di tipo agrometeorologico che agrofitologico, nonché acquisire consigli utili alla difesa fitosanitaria integrata.



REGIONE PUGLIA SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO E FITOSANITARIO REGIONALE ARIF PUGLIA

Via delle Magnolie, 6 - 70026 - Modugno (Bari)

DIREZIONE GENERALE

Legale Rappresentante Direttore Generale:

Francesco Ferraro

Dirigente della Sezione Fitosanitaria:

Dott. Agr. Michele Tenore

www.arifpuglia.it

PEC: protocollo@pec.arifpuglia.it

STAMPA: Realizzato in proprio

La diffusione e/o la riproduzione parziale o totale dei testi, dei dati e delle illustrazioni è **vietata a termini di legge**. È consentita solo citando la fonte e previa autorizzazione scritta.