

## COS'E':

La processionaria è un lepidottero che vive a spese dei pini, in particolare Pino nero e Pino silvestre, e cedri.

## DANNI ALLA PIANTA:

La larva si alimenta degli aghi di pino provocandone la defogliazione. Sono rari i casi in cui questo danno compromette la salute dell'albero

## DANNI ALL'UOMO E ANIMALI:

Rappresentano il pericolo maggiore, infatti, il contatto con i peli urticanti delle larve può provocare **gravi reazioni allergiche e irritazioni cutanee**. L'adulto (la farfalla) non è pericoloso per la salute.



Per maggiori informazioni  
su processionaria contattare

Ufficio Agricoltura Comune di Ugento  
0833 557209  
[daniele.arcuri@comune.ugento.le.it](mailto:daniele.arcuri@comune.ugento.le.it)

Rielaborazione del volantino redatto da Regione Emilia - Romagna  
Settore Agricoltura, Caccia e Pesca

Campagna informativa a cura di



Comune di Ugento

*Thaumetopoea  
pityocampa*

**PROCESSIONARIA  
DEL PINO**



# COSA FARE

## IN CASO DI RITROVAMENTO

DOVE TROVO  
PROCESSIONARIA?

GIARDINO  
PRIVATO

AREA  
PUBBLICA

CHIEDO INFO AL  
MIO COMUNE

SEGNALO AL COMUNE  
LA PRESENZA

IL PROPRIETARIO  
ATTUA MISURE DI  
GESTIONE IN BASE  
ALLA STAGIONE

IL COMUNE ATTUA  
MISURE DI GESTIONE  
IN BASE ALLA  
STAGIONE

## INVERNO

Nella parte alta della chioma sono presenti i nidi con all'interno le larve. La raccolta e distruzione dei nidi, effettuata entro la fine di Febbraio, è considerato il metodo di lotta più efficace. Per l'intervento indossare opportuni DPI o rivolgersi a ditte specializzate. In alternativa, è possibile utilizzare trappole meccaniche per la cattura delle larve da posizionare lungo il tronco entro Febbraio.



## AUTUNNO

Le uova si schiudono e le giovani larve iniziano ad alimentarsi degli aghi provocando disseccamenti localizzati, successivamente le larve iniziano la costruzione dei nidi. Nel mese di Ottobre possono essere effettuati trattamenti di endoterapia con prodotti registrati.



## PRIMAVERA

Si osserva la caratteristica "processione" delle larve che continuano il ciclo biologico nel terreno, per poi riemergere come adulti in estate. **Questo è il momento in cui si ha il maggiore rischio di entrare in contatto con le larve. Evitare di avvicinarsi e ove possibile interdire l'area infestata.**



## ESTATE

L'adulto vola e depone le uova.

